



**11-12
SEPT.
2025**

- Radiologie Interventionnelle
- Chirurgie Vasculaire
- Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique
- Médecine vasculaire

PALAIS DU PHARO
MARSEILLE

www.sres-symposium.org



CAS CLINIQUE

Artères rénales et digestives


Marie GIORDANINO

Réponse au cas clinique

Diagnostic positif

Diagnostic positif = scanner AP en contraste spontané et après injection de produit de contraste aux temps artériel et portal

- Occlusion distale de l'artère mésentérique supérieure
- Pas de signe de souffrance digestive





Réponse au cas clinique

Proposition de prise en charge

Au total : **occlusion embolique distale** de l'AMS chez une patiente **sans signe de souffrance digestive** au scanner, **pas de défaillance d'organe** et **pas d'hyperlactatémie** au bilan biologique

- Traitement médical adapté
- Prise en charge **endovasculaire** pour revascularisation AMS
- **Pas d'exploration chirurgicale** systématique
- **Surveillance** clinique et biologique **rapprochée**



Ischémie mésentérique artérielle aiguë

Diagnostic

Scanner (sans injection) et après injection avec acquisitions au temps artériel et portal

→ Recherche d'occlusion

→ Recherche de signe de nécrose et de lésion digestive

Recommendation 32

New

Clinicians are recommended to mention the suspicion of acute mesenteric ischaemia in the referral for computed tomography angiography.

Class	Level	References	ToE
I	C	Lehtimäki <i>et al.</i> (2015), ¹³⁴ Wadman <i>et al.</i> (2010), ¹³⁹ Anglaret <i>et al.</i> (2021) ¹⁴⁴	

Recommendation 33


Unchanged

Urgent computed tomography angiography with contrast enhancement in arterial and venous phases with ≤ 1 mm slices (and optional non-contrast CT run) is recommended in patients suspected of acute mesenteric ischaemia, regardless of renal function.

Class	Level	References	ToE
I	B	De Simone <i>et al.</i> (2018), ¹³⁷ Zeng <i>et al.</i> (2023), ¹⁴² Yang <i>et al.</i> (2019) ¹⁴⁵	


Algorithme de prise en charge proposé par l'ESVS

Ischémie mésentérique artérielle occlusive




Algorithme de prise en charge proposé par l'ESVS

Ischémie mésentérique artérielle occlusive



Algorithme de prise en charge proposé à l'APHM

Ischémie mésentérique artérielle occlusive




Traitement médical additionnel : °antibiothérapie IV *antiagrégation plaquettaire IV

Prise en charge

Ischémie mésentérique artérielle occlusive

Focus traitement endovasculaire





**11-12
SEPT.
2025**

- Radiologie Interventionnelle
- Chirurgie Vasculaire
- Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique
- Médecine vasculaire

PALAIS DU PHARO
MARSEILLE

www.sres-symposium.org



Merci de votre attention